

## INFORMATIONS GÉNÉRALES, POUR UN TRAITEMENT DE RÉCUPÉRATION D'ESPACE AVEC UN PENDEX

Cher parent

Votre enfant entreprend un traitement de récupération d'espace. Voici quelques conseils et renseignements qui s'imposent pour le bon déroulement du traitement.

### ACTIVATIONS :

---

### INSTRUCTIONS

- Lors des activations, le patient peut ressentir une pression ou légère douleur au niveau des dents. Cet inconfort devrait s'estomper au cours des minutes qui suivront. Si cette douleur devenait insupportable et allait en augmentant au cours des heures et jours qui suivent, cessez les activations et contactez-nous.
- Il est normal qu'il y ait une *légère mobilité des dents*. Mais si l'appareil venait qu'à être mobile ou semblerait être décollé, cessez les activations et contactez-nous.
- Si vous perdez la clé pour faire les activations, contactez-nous et il nous fera plaisir de vous en remettre une autre. Il ne serait *pas prudent* de prendre autre chose (aiguilles, cure-dent, trombone) pour continuer les activations.
- Le Pendex est un appareil orthodontique à deux fonctions. Dans un premier temps, il travaille principalement sur les structures osseuses afin de retrouver une largeur palatine adéquate. Par la suite, les activations cesseront et l'appareil sera légèrement modifié pour amorcer le recul des molaires vers l'arrière.

### INCONFORT

- La présence d'un corps étranger dans la bouche, tel un appareil orthodontique augmente le flux salivaire. Il est normal d'avoir un surplus de salive et d'avoir de la difficulté à avaler pour quelques heures.
- Le faux palais de l'appareil peut modifier l'élocution pour les premiers jours suivant l'installation. La langue doit s'habituer à nouveau à se positionner contre le plastique de l'appareil pour une prononciation plus normale.
- Les dents qui servent d'appuis pour retenir l'appareil en place peuvent être sensibles pour quelque temps. Une alimentation plus molle est donc souhaitable pour les premiers jours.
- Les bagues qui recouvrent les molaires peuvent causer des irritations à l'intérieur des joues. Nous recommandons de recouvrir celles-ci avec de la cire jusqu'à la guérison.

D'ici quelques jours, tous ces inconforts vont disparaître et permettront à votre enfant de fonctionner normalement.